

# 564

**Tamaño:** Grande.

**Forma:** Redondeada, aplastada por los polos. Con frecuencia presentan un labio ligeramente más desarrollado.

**Zona pistilar:** Bien centrada, ápice suavemente oprimido, dentro de esta depresión presenta esbozo de mamelón con cubeta pequeña y profunda en las dos caras.

**Sutura:** Superficial y teñida del color de la chapa. Ligeramente hendida dentro de la cavidad peduncular y en el ápice, donde se prolonga hacia la cara dorsal.

**Cavidad peduncular:** Ancha y profunda.

**Piel:** Velloso, de pubescencia muy abundante, más bien corta y anteada. **Color:** Domina el amarillo anaranjado del fondo. Chapa rojo grana fuerte y oscuro que, con intensidad variable, cubre la mitad de la superficie. Sobre la chapa hay manchas y estrías de color rojo negruzco. En zonas pequeñas, la chapa es de color muy fuerte y no deja entrever el amarillo. Donde el rojo es más intenso se aprecia pequeño punteado en amarillo del color del fondo.

**Carne:** Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, muy dulce, aromática y suave. **Sabor:** Exquisito.

**Hueso:** Adherente a la carne, tamaño grande, forma alargada con tendencia a globosa y mucrón muy afilado. Cresta ventral saliente, más en su mitad inferior. Surco dorsal estrecho y poco profundo interrumpido varias veces por los surcos laterales. Superficie arenosa, muy esculpida con surcos profundos y largos en forma zigzagante, situados preferentemente en su tercio superior. El resto de la superficie con surcos más cortos y orificios grandes y profundos. Escaso punteado cerca del ápice. Polo peduncular abierto.

**Maduración:** Primera decena de septiembre en Granada.

